



Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека»

ИНН 4501172992 КПП 450101001 ОГРН 1124501001063

Юр.адрес: 640007, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, к.1

Тел.: 8 (3522) 54-50-54, 54-57-51 (факс)

Сайт: www.bee45.ru E-mail: newpaseka@yandex.ru

АПИСТИМ

стимулятор развития пчелиных семей

Форма выпуска

Апистим - сбалансированный комплекс микроэлементов для пчел на основе водорастворимых солей калия, магния и кобальта. Упаковывают в трехслойные полимерные пакеты по 10 г. Апистим повышает репродуктивную активность пчелиных маток, стимулирует развитие и повышает продуктивность пчелиных семей. Дозы и способ применения: стимулирующие подкормки проводят весной, после очистительного облета пчел; после окончания медосбора и откачки меда - в период наращивания молодых пчел на зиму. Весной 10 г препарата предварительно растворяют в небольшом количестве теплой кипяченой воды и тщательно смешивают с 5 л сахарного сиропа (1:1). Полученный сироп скармливают пчелам в верхних кормушках по 300-500 мл через день в течение 2-х недель. Для поения пчел препарат добавляют в поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды.

Общие сведения

Апистим (Apistim) кормовая добавка для стимуляции развития семей пчел. Апистим - сбалансированный комплекс солей микроэлементов: калия фосфорнокислого (25%), магния сернокислого (36%) и кобальта хлористого (1,2%), а также сахарозы в качестве наполнителя. По внешнему виду Апистим представляет собой порошок бело-розового цвета со специфическим запахом, растворимый в воде.

Форма выпуска

Расфасован по 10 г в пакетах из многослойной фольги. Каждую упаковку маркируют с указанием: названия, назначения и состава добавки, названия организации-производителя, ее массы, адреса и товарного знака, знака соответствия качества, даты изготовления и срока годности, номера серии, обозначения ТУ, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Биологические свойства

Входящие в состав Апистима микроэлементы оказывают стимулирующее действие на развитие и продуктивность пчел, повышают репродуктивные свойства пчелиных маток. Апистим не токсичен для пчёл, в рекомендуемой дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчёл.

Порядок применения

Апистим применяют для стимуляции развития семей пчёл. Перед применением Апистим вносят в теплый сахарный сироп, приготовленный в соотношении 1:1, из расчета 10 г препарата на 5 л сиропа. В весенний период сироп с Апистимом наливают в верхние кормушки ульев из расчета 200-300 мл на одну семью пчел и скармливают пчелам через 1 день в течение 2-х недель. В летне-осенний период приготовленный сироп скармливают семьям пчел после откачки меда по 2-5 л в зависимости от силы пчелиных семей. Сироп дают пчелам через день по 500-1000 мл в кормушках после окончания лета пчёл. Для поения пчёл Апистим добавляют в поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды. При применении добавки в рекомендованных количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено. Апистим совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. Мёд, полученный от семей пчел после применения Апистима, в соответствии с инструкцией по применению, используют в пищевых целях без ограничения.

Меры личной профилактики

При работе с Апистимом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены.



Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека»

ИНН 4501172992 КПП 450101001 ОГРН 1124501001063

Юр.адрес: 640007, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, к.1

Тел.: 8 (3522) 54-50-54, 54-57-51 (факс)

Сайт: www.bee45.ru E-mail: newpaseka@yandex.ru

Условия хранения

В упаковке организации-производителя в сухом помещении, недоступном для детей при температуре от минус 10 до +35°C.

Срок годности

2 года со дня изготовления.