



Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека»

ИНН 4501172992 КПП 450101001 ОГРН 1124501001063
Юр.адрес: 640007, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, к.1
Тел.: 8 (3522) 54-50-54, 54-57-51 (факс)
Сайт: www.bee45.ru E-mail: newpaseka@yandex.ru

АПИТАК

для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчёл

Форма выпуска

Прозрачная жидкость, содержащая 12,5% амитраза. В коробочках по 2 ампулы по 1,0 мл (40 доз).

Общие сведения

Апитак - акарицидное средство, предназначенное для лечения варроатоза пчел. Апитак содержит в качестве действующего вещества амитраз (12,5%) и эфирное масло чабреца (1,5%), а также вспомогательные компоненты неонол (2%) и ксилол. По внешнему виду Апитак представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со специфическим запахом. Выпускают Апитак расфасованным по 0,5 и 1,0 мл в стеклянные ампулы, которые маркируют с указанием наименования и объема препарата. уложенные по 2 штуки в картонные коробки. Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия средства, наименования и количества действующего вещества, знака соответствия качества, даты изготовления и срока годности, номера серии, условий хранения, надписи «Для животных», обозначения ТУ и снабжают инструкцией по применению.

Дозы и способ применения

1 мл препарата разводят в 2-х литрах чистой воды до получения равномерной эмульсии. Лечебные обработки проводят осенью, после окончания медосбора, в период отсутствия в семьях расплода, при температуре не ниже 0°C. Семьи обрабатывают 2-хкратно с интервалом 7 дней, путем поливания пчел в улочках, из расчета 10 мл рабочей эмульсии на одну улочку пчёл. Апитак применяют для лечения варроатоза пчел после окончания медосбора, в осенний период при отсутствии расплода в семьях пчел. Перед применением 1 мл лекарственного средства разводят в 2 литрах теплой (35-40°C) кипяченой воды до получения равномерной эмульсии. Приготовленный раствор набирают в шприц и поливают находящихся в улочках пчел из расчета 10 мл на одну улочку. Лечебные обработки проводят 2-кратно с интервалом 7 дней. Апитак с истекшим сроком годности утилизируют, закапывая в землю на глубину 30-40 см в специально отведенных для этих целей местах.

Меры личной профилактики

При работе со средством следует использовать резиновые перчатки. Следует избегать попадания Апитака и его рабочей эмульсии в глаза и на слизистые оболочки. По окончании работы лицо и руки необходимо вымыть теплой водой с мылом. При случайном попадании средства в глаза, его необходимо смыть проточной водой. Апитак следует хранить в местах, недоступных для детей.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 2 мл, упакованные в блистеры.

Условия хранения

В таре организации-производителя в темном, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0 до 25°C.

Срок годности

2 года со дня изготовления.